Apports méthodologiques et pratiques tirés d'une étude autécologique sur le chêne sessile à l'échelle de la moitié Nord de la France

Laurent Bergès¹, Richard Chevalier¹,
Jean-Claude Gégout², Alain Franc³

¹ Cemagref, UR Écosystèmes Forestiers, Domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson, France

² ENGREF, LERFOB, Équipe Écosystèmes Forestiers et Dynamique des Paysages, 14 rue Girardet, 54042 Nancy, France

³ INRA, Département Écologie des Forêts, Prairies et Milieux Aquatiques, CDA UMR Biodiversité, Gènes et Écosystèmes, 69 route d'Arcachon, Pierroton, 33612 Cestas Cedex, France

Contexte

- Débat à propos des études autécologiques : précision des résultats décevante au regard du coût
- Question de l'échelle d'étude : petite région naturelle *versus* grande région ?
- Débat sur l'utilisation de la flore comme indicateur du type de station en comparaison des variables climat, sol et topographie : quelle est la meilleure approche ?
- Problèmes d'estimation de la réserve utile maximale en eau du sol
- Rôle des tendances à long terme et de la densité du peuplement sur la croissance : poids de ces facteurs ?

Contexte

- Questions propres au chêne sessile :
 - Essence paradoxalement moins étudiée que d'autres
 - Beaucoup de travaux mettant en avant les différences entre les deux espèces de chêne (Lévy *et al.* 1992, Becker *et al.* 1996)
 - Des recherches en écophysiologie ayant mis en avant le fort effet de la disponibilité en eau sur la croissance (Bréda *et al.* 1996)
 - Étude menée sur la forêt de Tronçais (Jacquemin *et al.* 2000) mais pas d'études sur un territoire plus vaste

Objectifs et hypothèses

- Tester la faisabilité d'une étude autécologique sur un vaste territoire
 - **Hypothèse : peu ou pas de baisse si mis en place d'une stratégie d'échantillonnage adaptée et mesure de prédicteurs de qualité**
- Quantifier la part respective des bilans radiatif, hydrique et trophique sur la croissance en hauteur
 - **Hypothèse : part importante de chaque facteur dès lors que l'on couvre l'ensemble des gradients stationnels**
- Comparer la qualité de précision de la croissance par des indices floristiques et des indices abiotiques (climat et sol, y compris analyses chimiques), et tester leur complémentarité
 - **Hypothèse : meilleure prédiction par les indices abiotiques**

Objectifs et hypothèses

- Évaluer la fiabilité de différents estimateurs de la réserve en eau du sol
 - **Hypothèse : besoin de mesurer avec soin la réserve en eau sur la plus grande profondeur possible**
- Explorer le rôle de l'âge et de la densité du peuplement comme facteurs explicatifs supplémentaires dans les études autécologiques
 - **Hypothèse : effet de l'âge liée à l'augmentation de productivité, et effet faible mais négatif de la densité du peuplement**

Zone d'étude

Zone d'étude

Région Ouest

Zone d'étude

Région Est

Matériel et méthodes

- Plan d'échantillonnage croisant RU et niveau trophique de manière la plus équilibrée possible
- Contrôle des autres facteurs : engorgement, altitude
- Sélection stricte des types de peuplements : futaie régulière adulte, pure et fermée
- 99 placettes répartis dans les deux régions "Ouest" et "Est" de la moitié Nord de la France
- Inventaire dendrométrique avec sondage à la terrière et calcul de l'indice de fertilité = hauteur dominante à 100 ans
- Creusement de fosses pédologiques à la pelle mécanique
- Description des fosses détaillée et analyse de sol complète : granulométrie, propriétés chimiques
- Relevés floristiques en CAD puis analyse par (1) AFC, (2) calcul de VIM avec les coefficients d'Ellenberg et calcul de

Matériel et méthodes

- Utilisation du modèle B de Duplat et Tran-Ha (1997) pour calculer l'indice de fertilité

Duplat, P., and Tran-Ha, M. 1997. Modelling the dominant height growth of sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) in France - Inter-regional variability and effect of the recent period (1959-1993). *Ann. Sci. For.* 54(7): 611-634

Autécologie du chêne sessile

- Effet de la position topographique

Autécologie du chêne sessile

- Effet de la réserve utile en eau du sol (calculée sur 1,50 m)

Autécologie du chêne sessile

- Effet du type d'humus : optimum

Autécologie du chêne sessile

- Effet de $\log(\text{Ca})$ et de S/T

Autécologie du chêne sessile

Sol avec un horizon carbonaté (n=30) :

- Effet négatif de $\log(\text{Ca})$
- Pas d'effet de $\text{K}/\text{P}_2\text{O}_5$
- Effet de Ca/Mg et de Mg/K :

$$\text{SI}_{100} = 30.4 - 0.34 (\text{Ca}/\text{Mg}) - 1.09 (\text{Mg}/\text{K}) \quad R^2=0,381$$

Sol sans horizon carbonaté (n=69) :

- Effet curvilinéaire de $\log(\text{Ca})$
- Effet de $\text{K}/\text{P}_2\text{O}_5$

$$\text{SI}_{100} = 31.8 - 2.15 (\text{K}/\text{P}_2\text{O}_5) \quad R^2=0,225$$

- Pas d'effet de Ca/Mg ni de Mg/K

Figure 4. Relationships between SI_{100} and exchangeable Ca in the A-horizon according to soil type (with and without a carbonated horizon) and corresponding regression lines.

Bilan sur l'autécologie du chêne sessile

- Rôle de la réserve utile en eau du sol, de la position topographique, de $\log(\text{Mg})$, $\log(\text{Ca})$, $\text{K}/\text{P}_2\text{O}_5$, Mg/K et du type d'humus sur l'indice de fertilité
- Aucune différence inter-régionale sur l'indice de fertilité, et faible effet du climat sur la croissance
- Modèles ajustés au niveau de chaque région très proches
- Part de variance de SI_{100} expliquée par le niveau trophique > part liée aux facteurs hydriques et climatiques, mais avec part commune importante

Échelle d'étude

- Le climat, la topographie et le sol expliquent de **49 à 60%** de la variance de l'indice de fertilité du chêne
 - une étude autécologique peut être menée avec succès sur un vaste territoire si une stratégie d'échantillonnage adaptée est appliquée

M1	$SI_{100} = 23,0 + 0,022 \text{ (SWC 0-150)} + 0 \text{ (G<L)} + 1,8 \text{ (G=L)} + 3,9 \text{ (G>L)} - 5,76 \text{ (log(Mg))} - 6,59 \text{ (log(Mg))^2} - 0,764 \text{ (K/P}_2\text{O}_5)$	0,491	3,36
M2	$SI_{100} = 19,2 + 0,026 \text{ (SWC 0-150)} - 5,39 \text{ (log(Mg))} - 6,13 \text{ (log(Mg))^2} + 0 \text{ (Dysmoder-Mor)} + 3,82 \text{ (Eumoder)} + 4,82 \text{ (Hemimoder to Oligomull)} + 4,86 \text{ (Mesomull)} + 1,40 \text{ (Eumull)}$	0,600	3,00
M3	$SI_{100} = 21,7 + 0,019 \text{ (SWC 0-150)} + 3,70 \text{ (log(S))} - 3,96 \text{ (log(S))^2} - 0,70 \text{ (Mg/K)} + 0 \text{ (Dysmoder-Mor)} + 4,16 \text{ (Eumoder)} + 5,31 \text{ (Hemimoder to Oligomull)} + 5,45 \text{ (Mesomull)} + 1,72 \text{ (Eumull)}$	0,596	3,03

Comparaison flore / sol, climat

Comparaison flore / sol, climat

Comparaison flore / sol, climat

- Les indices floristiques expliquent la même part de variance de l'indice de fertilité que les indices basées sur le climat, la topographie et le sol : $R^2=0,49$ à $0,60$
- Modèles meilleurs en combinant les variables floristiques et abiotiques : $R^2=0,57$ à $0,69$

	bilan hydrique	niveau trophique
indices floristiques	2	1
variables pédoclimatiques	1	2

M1	$SI_{100} = 23,0 + 0,022 (\text{SWC } 0-150) + 0 (\text{G}<\text{L}) + 1,8 (\text{G}=\text{L}) + 3,9 (\text{G}>\text{L}) - 5,76 (\log(\text{Mg})) - 6,59 (\log(\text{Mg}))^2 - 0,764 (\text{K}/\text{P}_2\text{O}_5)$	0,491	3,36
M2	$SI_{100} = 19,2 + 0,026 (\text{SWC } 0-150) - 5,39 (\log(\text{Mg})) - 6,13 (\log(\text{Mg}))^2 + 0 (\text{Dysmoder-Mor}) + 3,82 (\text{Eumoder}) + 4,82 (\text{Hemimoder to Oligomull}) + 4,86 (\text{Mesomull}) + 1,40 (\text{Eumull})$	0,600	3,00
M3	$SI_{100} = 21,7 + 0,019 (\text{SWC } 0-150) + 3,70 (\log(\text{S})) - 3,96 (\log(\text{S}))^2 - 0,70 (\text{Mg}/\text{K}) + 0 (\text{Dysmoder-Mor}) + 4,16 (\text{Eumoder}) + 5,31 (\text{Hemimoder to Oligomull}) + 5,45 (\text{Mesomull}) + 1,72 (\text{Eumull})$	0,596	3,03
M4	$SI_{100} = -5,56 + 5,50 (\text{mF}) - 4,54 (\text{mK}) + 8,51 (\text{mR}) - 0,92 (\text{mR})^2$	0,530	3,19
M5	$SI_{100} = 26,3 - 0,46 (\text{Axis } 1) - 2,34 (\text{Axis } 1)^2 + 1,47 (\text{Axis } 2) - 3,66 (\text{Axis } 3)$	0,553	3,12
M6	$SI_{100} = 24,3 + 0,011 (\text{SWC } 0-150) - 1,61 (\text{Axis } 1)^2 + 1,25 (\text{Axis } 2) - 3,54 (\text{Axis } 3)$	0,571	3,06
M7	$SI_{100} = 26,5 + 0,015 (\text{SWC } 0-150) - 0,94 (\text{Mg}/\text{K}) - 2,32 (\text{Axis } 1)^2 - 2,92 (\text{Axis } 3)$	0,625	2,86
M8	$SI_{100} = 24,5 + 0,017 (\text{SWC } 0-150) - 0,80 (\text{Mg}/\text{K}) + 0 (\text{Dysmoder-Mor}) + 2,74 (\text{Eumoder}) + 1,85 (\text{Hemimoder to Oligomull}) + 2,75 (\text{Mesomull}) + 0,03 (\text{Eumull}) - 1,87 (\text{Axis } 1)^2 - 2,53 (\text{Axis } 3)$	0,686	2,67
M9	$SI_{100} = 9,4 + 0,014 (\text{SWC } 0-150) + 0 (\text{G}<\text{L}) + 0,5 (\text{G}=\text{L}) + 3,2 (\text{G}>\text{L}) - 3,37 (\log(\text{Mg})) - 3,12 (\log(\text{Mg}))^2 + 0,54 (\text{mIVSI}_{100})$	0,660	2,75

Diagnostic stationnel

- ensemble des placettes
- profondeur de sol > 150 cm

Diagnostic stationnel

- Gain d'explication en intégrant la texture des horizons
- Mais faible taux de variance expliquée (25%) en dépit des moyens mis en œuvre
- Prendre en compte la RUM au-delà de 1,50 m de profondeur n'améliore pas la prédiction de la productivité
 - l'eau contenue dans les horizons profonds ne sert pas à la croissance en hauteur et en diamètre (Rambal 1984, Bréda et Granier 1996, Otieno 2006,)
- Comment améliorer l'estimation de la RUM ?
 - Mesure systématique de la densité apparente

Prise en compte de l'âge et de la surface terrière du peuplement

Prise en compte de l'âge et de la surface terrière du peuplement

- Fort "effet" **néгатif** de l'âge du peuplement
- Faible "effet" **positif** de la densité du peuplement : indice de densité de Reineke (RDI)
- Amélioration des modèles : $R^2=0,80$ à $0,82$
- Conservation de l'effet de la plupart des variables
- Ajout de certains prédicteurs stationnels : précipitations, température, altitude...

T6	$SI_{100} = -20,0 -0,093$ (Age) $+7,98$ (RDI) $+0,028$ (MAP) $+2,81$ (MAT) $+0,016$ (SWC 0-150) $-0,46$ (K/P ₂ O ₅) $+2,64$ (Axis 1) ²	0,820	2,01
T7	$SI_{100} = 21,8 -0,100$ (Age) $+6,09$ (RDI) $+0,028$ (MAP) $-4,88$ (East) $-0,015$ (Altitude) $+0,021$ (SWC 0-150) $-0,687$ (K/P ₂ O ₅) $+2,58$ (Axis 1) $-0,85$ (Mg/K)	0,810	2,09
T8	$SI_{100} = 17,9 -0,075$ (Age) $+4,82$ (RDI) $+0,012$ (SWC 0-150) $+0,53$ (G=L) $+2,44$ (G>L) $+0$ (Dysmoder-Mor) $+1,85$ (Eumoder) $+1,00$ (Oligomull to Hemimoder) $+0,58$ (Mésomull) $-0,56$ (Eumull) $+0,379$ (mlVSI ₁₀₀)	0,815	2,07

Les enseignements

- Travailler sur de vastes territoires plutôt qu'à l'échelle de la petite région naturelle
- Bonne prédiction de la croissance, à condition de s'appuyer sur un plan d'échantillonnage adaptée
- Utiliser de manière complémentaire la flore et les variables sol, climat, topographie
 - RUM : diagnostic sur 1 m de profondeur (% cailloux et texture)
 - Niveau trophique : type d'humus ou flore
- Tenir compte des paramètres âge et densité dans les études autécologiques
- Besoin de valider ces résultats sur d'autres essences (*cf.* travaux d'Ingrid Seynave (ENGREF LERFoB Nancy))

Merci de votre attention

- Bergès L., 1998. Variabilités individuelle et collective de la croissance et de la densité du bois de *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. en relation avec les facteurs écologiques. Thèse de Doctorat, Sciences Forestières, ENGREF, Nancy, 390 p.
- Bergès L., Chevalier R., Dumas Y., Franc A. et Gilbert J.M., 2005. Sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) site index variations in relation to climate, topography and soil in even-aged high-forest stands in northern France. *Ann. For. Sci.*, 62, 5, p. 391-402.
- Bergès L., Gégout J.C. et Franc A., 2006. Can understory vegetation accurately predict site index? A comparative study using floristic and abiotic indices in sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) stands in northern France. *Ann. For. Sci.*, 63, 1, p. 31-42.
- Bergès L., soumis. Selection of reliable soil and topography descriptors for moisture and nutrient status by using sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) site production. *Can. J. For. Res.*